

DB1309

沧州市地方标准

DB1309/T 156—2022

代替 DB1309/T 156-2014

农大棉 9 号高产栽培技术规程

地方标准信息服务平台

2022 - 09 - 26 发布

2022 - 10 - 26 实施

沧州市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB1309/T 156-2014《农大棉9号高产栽培技术规程》，与DB1309/T 156-2014相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 删除了产量结构（见2014年版的第5章）；
- 更改了播种时间（见5.3，2014年版的6.3）；
- 更改了播种方式（见5.4，2014年版的6.4）；
- 删除了整枝（见2014年版的7.3）；
- 更改了追肥浇水（见6.2，2014年版的7.4）；
- 更改了化控（见6.3，2014年版的7.5）；
- 删除了中耕除草（见2014年版的7.7.1）；
- 增加了脱叶催熟（见8.1）；
- 增加了残膜回收（见第9章）。

本文件由河间市市场监督管理局提出。

本文件由沧州市农业农村局归口。

本文件起草单位：河间市国欣农村技术服务总会、沧州市农业农村局。

本文件主要起草人：卢怀玉、齐海坤、徐东永、王玉坤、张伯谦、左彦利、谷敏、王伟红、沈庆信、王平、赵丽娜、叶光、张磊、高志刚、刘博。

本文件于2014年首次发布，本次为第一次修订。

地方标准信息服务平台

农大棉 9 号高产栽培技术规程

1 范围

本文件规定了农大棉9号高产栽培的基础条件、整地播种、田间管理、化学除草、采收及残膜回收。

本文件适用于农大棉9号春播种植。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4407.1 经济作物种子 第1部分：纤维类

NY 400 硫酸脱绒与包衣棉花种子

NY/T 1387-2007 黄河流域棉花生产技术规程

NY/T 3659-2020 黄河流域棉区棉花全程机械化生产技术规范

DB13/T 2914-2018 机采棉花株型化控与脱叶催熟技术规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 基础条件

选择地势平坦、肥力中等、土层深厚、灌排条件良好的地块。

5 整地播种

5.1 施足基肥、精细整地

播前及时灌溉造墒，精细整地，做到上虚下实，无明暗坷垃。中等肥力棉田结合整地每亩施有机肥 $2\text{m}^3 \sim 3\text{m}^3$ 、磷（ P_2O_5 ） $3\text{kg} \sim 4\text{kg}$ 、钾（ K_2O ） $6\text{kg} \sim 10\text{kg}$ 。

5.2 种子质量

种子质量应符合GB 4407.1和NY 400中的规定。

5.3 播种时间

适播期为4月15日～4月25日。

5.4 播种方式

采用地膜覆盖机械精量播种，等行距播种，行距100cm或76cm，播深2cm~3cm，每亩4500株左右。

6 田间管理

6.1 及时放苗

播种后及时检查播种质量，及时压严地膜。棉苗出土子叶变绿开始放苗，避开晴天中午时间。

6.2 追肥浇水

盛蕾后遇旱及时浇水，盛花期一次性亩追施尿素15kg。

6.3 化控

根据棉花长势及时化控，化控方法按DB13/T 2914-2018中第5章的规定执行。

6.4 虫害的防治

按NY/T 1387-2007中8.2的规定进行。

7 化学除草

播种前喷施精异丙甲草胺，每亩用量100ml。生育期间禾本科杂草发生严重时，在杂草5叶期前用高效氯氟吡氧乙酸喷雾防治，每亩用量20ml~30ml。

8 采收

8.1 脱叶催熟

按DB13/T 2914-2018中第8章的规定执行。

8.2 及时采收

按NY/T 3659-2020中第8章的规定执行。

9 残膜回收

田间残膜及时回收，集中处理。
